

लागू पदार्थ दुर्व्यसन रोकथामका तथ्यहरू र किशोरहरूका लागि सुझाव

- ओपियड अथवा ओपियट शब्दले मस्तिस्कको ओपियड रिसेप्टर भन्ने भागमा गएर टाँसिने औषधि अथवा रसायन भन्ने बुझाउँछ। ओपियडहरू दुखाई कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी एकदमै लत लाग्ने खालका हुन्छन्। ओक्सिकोटीन, पर्कोसेट, भाइडोडिन, डिमेरोल, मोर्फिन, र मेथाडोन प्रेस्क्रीप्सनमा (डाक्टरले लेखिदिएको औषधि) दिईने ओपियडका उदाहरणहरू हुन्। हेरोइन पनि ओपियड हो।
- लागू पदार्थमा लत लाग्न सक्ने सम्भावना हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ। गाँजा खाने व्यक्तिमा ११ जनामा १ जनालाई लत लाग्ने गर्दछ। १५ वर्ष वा सो भन्दा मुनिको उमेरमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने १० जना बालबालीकाहरूमा ४ जनालाई अन्ततः मादक पदार्थको लत लाग्दछ। हेरोइनमा लत लागेका ५ जना व्यक्तिमा ४ जनाले प्रेस्क्रीप्सन औषधीको दुरुपयोग गरेर सुरु गरेका थिए।
- साथी अथवा नातेदारले दिएका प्रेस्क्रीप्सन औषधि (दुखाईको लागि ओपियट वा एडिएचडि को लागि स्टिमुलेन्ट) कहिल्यै पनि नखानु होला। तपाईंलाई चोट पटक लागेर दुख्यो भने आफ्नो डाक्टरसँग भेट्नु होस्। यस्ता औषधीहरूको दुरुपयोगले त्रसित हुने, मूर्छा पर्ने, हृदयघात जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउँदछ र मृत्यु समेत हुन सक्छ।
- तपाईंको आफ्नो प्रेस्क्रीप्सन औषधि अथवा एडिएचडिको दवाइ साथी तथा नातेदारहरूसँग कहिल्यै पनि नबाँड्नु होस्। तपाईंले आफूले औषधी दिएर सहयोग गरेको जस्तो लाग्न सक्छ तर प्रेस्क्रीप्सनमा नदिईएको औषधी एकदमै खतरा हुन सक्छ।
- विभिन्न औषधिहरूले विभिन्न किसिमले काम गर्दछन्, तर ती सबैले मस्तिस्कलाई असर पार्दछन् – त्यसैले गर्दा तपाईंलाई लागू औषधले उत्तेजित बनाउने, ढिलासुस्ति गराउने, द्रुत गति मा लैजाने, सुस्त बनाउने वा नभएको कुरा देखिने बनाउँदछन्।
- बारम्बार लागू औषधको प्रयोगले ब्रेन्स प्लेजर मिटर (मस्तिस्कमा हुने रमाईलो गराउने मिटर) पूनःसञ्चालन गरिदिन्छ जसले गर्दा औषधी बिना तपाईं असहाय, दुखी र एकलो महशुस गर्नु हुन्छ। अन्ततः दैनिक हुने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले पनि तपाईंलाई खुशी बनाउन सक्दैन।
- मादक पदार्थ सेवन गर्ने र लागू औषधि सेवन गर्ने बालबालीकाहरू हिंसक अपराधको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ, कार दुर्घटनामा पर्न सक्ने र स्कूलमा गम्भीर समस्याहरू हुन सक्छन्।
- यदि तपाईंले धेरै गाँजा वा अन्य लागू पदार्थहरू सेवन गर्नु भयो भने तपाईंले आफ्नो बौद्धिक क्षमता गुमाउन सक्नु हुन्छ जुन तपाईंले फेरि कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्नु हुन्न।
- चुरोट खाने धेरै जसो मानिसहरूले १८ वर्षको उमेर भन्दा अगाडि नै खान शुरु गरेका थिए। विद्युतीय सिगरेट पनि उत्तिकै हानिकारक छन् किनकि त्यसमा पनि निकोटिन र अन्य हानिकारक रसायन हुन्छन्।
- तपाईं रक्सी वा लागू पदार्थको नशाले उत्तेजित भएको बेला सिधा सोच्न सक्नु हुन्न, यस अवस्थामा तपाईंले सुरक्षितसँग यौन सम्बन्ध राख्न विर्सन सक्नु हुनेछ। असुरक्षित यौन सम्बन्धले एच आई बी र हेपाटाइटिस सि जस्ता दीर्घकालीन रोग लाग्न सक्दछ।
- अन्य औषधीहरू वा रक्सीमा लागू औषधि मिसायो भने यसले औषधीको मात्रा बढी भई दुर्घटनाबस् मृत्यु हुन सक्ने जोखिम अधिक हुन्छ।
- तपाईंलाई आफू लागू पदार्थ र मादक पदार्थको लतले गर्दा समस्यामा छु भन्ने लाग्छ भने कृपया सहयोगको खोजी गर्नुहोस्। आफ्नो आमाबुवा, स्कूलको नर्स, काउन्सिलर, डाक्टर, अथवा अन्य आफ्नो विश्वासिलो वयस्क व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस्। लत वास्तविक कुरा हो तर यसको लागि सहयोग उपलब्ध छ: 1-800-662-HELP (गोप्य हटलाईन) अथवा www.helpline-online.com

नेशनल ईन्स्टीच्यूट अन ड्रग एब्युजको वेबसाइट www.drugabuse.gov, www.teens.drugabuse.gov, वा <http://teen-safe.org> बाट अरु थप सुझावहरू र जानकारी लिनुहोस्।